Chuleta: tratamiento y seguimiento de la sífilis

mischuletasmedicas.com/2019/04/24/chuleta-tratamiento-y-seguimiento-de-la-sifilis

Ver todas las entradas de SUSANA UBIERNA LLONA

24 de abril de 2019



Ultimamente, y supongo que nos pasará a todos, veo cada vez más casos de sífilis.

Ya manejamos bien el diagnóstico serológico:

Serología Sífilis

RPR/VDRL (no treponémicas, inespecíficas)


- Se utilizan para el cribado
- Se negativizan entre 3-12 meses tras tratamiento.
- Sirven para el seguimiento

FTA-ABS/TP-PA (treponémicas, específicas)

- Confirman el diagnostico
- No se negativizan

Y a continuación expongo la evolución natural de la enfermedad si no se tratara:

Sífilis: Evolución sin tratamiento



Pero manos mal que apareció el gran Alexander Fleming con la penicilina. Desde 1928 no hemos tenido ningún antibiótico que nos haya aportado tantas alegrías.

Tratamiento Sífilis primaria, secundaria

Elección: Penicilina G benzatina 2,4 millones U IM dosis única

Alternativas:

- Doxiciclina 100mg/12h-14 días
- •Azitromicina: 1 g inicio, 0,5 g/día × 10 días o 2 g dosis única

Las parejas sexuales de los últimos 90 días, aunque sean seronegativas, deben ser tratadas

Y para finalizar, ¿cómo hacemos el seguimiento del paciente una vez que lo hemos tratado?:

Sífilis: seguimiento

Realizar VDRL a los 3, 6, 12 y 24 meses

VDRL debe descender cuatro veces en 6 meses y ocho veces en 12-24 meses

Si no descienden a los 12-24 meses será necesario un nuevo ciclo de tratamiento ante la posibilidad de un fracaso terapéutico o de una reinfección